



倒伏軽減剤・被覆尿素入り
穂肥肥料

Sumi
スミショート®
Short



正味15kg樹脂袋

35 [23-1-11
チッソ リンサン カリ
+
倒伏軽減剤
0.008%]

1 短稈化による倒伏軽減

2 幼形期施用による安定多収

3 被覆肥料による肥効の持続

スミショート35の肥効イメージ

倒伏軽減剤と被覆尿素の入った一発穂肥です


スミショート35の効果

(23-1-11 NET15kg)
チッソ リンサン カリ

幼形期穂肥

倒伏軽減

被覆肥料による
肥効の持続



安定多収

省力

食味向上


使用方法

使用時期：出穂前25（幼穂形成期）～20日

使用量：10a当り15kg
(N3.5kg、倒伏軽減剤1.2g)

使用方法：湛水散布

ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数：
2回以内（本田は1回）



特長

①倒伏軽減剤入り穂肥です。

倒伏軽減剤「ウニコナゾールP」を添加してありますので、倒伏を心配せずに最適な穂肥時期の出穂25日前に施用でき、倒伏軽減と安定多収がはかれます。

②被覆尿素の配合で、穂肥を1度に施用でき、省力となります。

10a当り15kg(1袋)の施用で、チッソ成分量は3.5kgです。

③穂の生育に合う肥効です。食味も向上します。

チッソ成分の内60%が被覆チッソですので、おだやかな肥効が持続し、食味も向上します。

使用上のご注意

- ①スミショート35は倒伏軽減剤入りですので、上記の使用方法を厳守してください。
- ②スミショート35は水稻以外の作物には使わないでください。また、本田でのウニコナゾールP含有薬剤との併用や二重散布は絶対にさけてください。
- ③使用量は倒伏軽減剤の適量を基準としています。不足する肥料分は他の肥料（例えば銀泉特号、たま化成）で補ってください。
- ④使用時期が近づいたら徐々に水を入れ、スミショート35を湛水散布したのち3～4日間止水してください。

施肥設計の例 (10a当り)

基肥	幼穂形成期穂肥(出穂前25日頃)
スミベース 25～40kg(N 2.0～3.2kg)	スミショート35 15kg(N 3.5kg)

●詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関等もしくは住友肥料販売店にご相談ください。