

良質米穂肥の決定版



倒伏軽減剤入り
穂肥肥料

スミショート®

144

14-2-17

チッソ リンサン カリ

+


倒伏軽減剤

0.012%

正味10kg樹脂袋

1

短稈化による倒伏軽減




2

幼形期施用による安定多収

プラス

+



肥料農水省登録番号 生第74203号 農薬農水省登録番号 第18201号

スミショート/SUMISHORTは住友化学(株)の登録商標

特約販売店

 住友化学株式会社

〒104-8260 東京都中央区新川二丁目27番1号

お客様相談室  0570-058-669

農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>

倒伏軽減剤の入ったニュータイプの肥料です

肥料及び農薬成分 (10kg袋)

窒素全量	内アンモニア性窒素	可溶性りん酸	内水溶性りん酸	水溶性加里	ウニコナゾールP
14.0	9.0	2.0	1.0	17.0	0.012%

特 長

- ①倒伏軽減剤「ウニコナゾールP」を添加した水稻の穂肥専用肥料で、節間の伸長を抑制し、倒伏を軽減します。
- ②コシヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれ、ササニシキなどの倒伏しやすい品種の穂肥として、出穂前25～10日(幼穂形成期～減数分裂期)に倒伏を心配せずに施用でき、良質米の安定多収に役立ちます。
- ③粒ぞろいが良く粒が大きいので、機械散布に適しています。

使用方法

従来の肥料と異なり、倒伏軽減剤入り肥料ですので使用方法を厳守してください。

使用時期:出穂25～10日前(幼穂形成期～減数分裂期)

使用量:7～10kg(10アール当り)

使用方法:湛水散布

ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数:2回以内(本田は1回)

- 施用の際は3～5cmの水深を保ち散布し、3～4日間止水してください(倒伏軽減剤の効果を発揮するため)。
- 散布むらのないように田面に均一に散布ください(短稈効果を均一にするため)。

施用例 (10アール当り)

品 種	基 肥	穂 肥	
		穂肥I 出穂25日前～10日前	穂肥II 出穂15日前
コシヒカリ	コシヒカリ えびす印燐安加里 (10-14-13) 20～40kg (N=2.0～4.0kg)	スミショート14 10kg (N=1.4kg)	(葉色を見て) 銀泉特号 0～15kg (N=0～2.1kg)
	スーパーSRコート コシヒカリ(M) ハイチッソ043 (20-14-13) 20～30kg (N=4.0～6.0kg)	出穂25日前～10日前	
ひとめぼれ あきたこまち	ひとめぼれ・あきたこまち ハイチッソ441 (24-14-11) 30～45kg (N=7.2～10.8kg)	(葉色を見て) スミショート14 7～10kg (N=1.0～1.4kg)	(葉色を見て) スミショート14 7～10kg (N=1.0～1.4kg)

●詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関等もしくは住友肥料販売店にご相談ください。